# KEGAWATDARURATAN SISTEM SARAF



# otak



Dibagi mjd 3 bagian besar :

1. Serebrum
2. Batang otak
3. Serebellum

Ke 3 bagian tsb berada dalam satu struktur tl tengkorak.

Fx tengkorak: melindungi otak dari cedera


CENTRAL SULCUS
PRECENTRAL GYRUS
POSTCENTRAL GYRUS
PARIETAL LOBE
FRONTAL LOBE
OCCIPITAL LOBE
LATERAL SULCUS
CEREBELLUM
TEMPORAL LOBE
MEDULLA

# Otak

- Otak terdapat dalam liquor cerebrospinalis.
- Fraktur cranium terbuka dan fraktur basis cranii dengan CSS keluar dari hidung dan telinga merupakan keadaan berbahaya krn dapat menimbulkan perdangan otak
- Pembengkakan otak dikenal dg edema cerebri
- Kondisi ini akan dibarengi dg peningkatan TIK (tekanan intra cranial)

# Lapisan Pelindung Otak

3 membran lapisan pelindung otak/meningen:

- **DURAMATER** (lapisan paling luar, menutup otak dan medulla spinalis.Sifat: liat, tebal, tidak elastis, berwarna abu-abu.menempel ketat pada bagian dalam tengkorak)
- **PIAMATER** (membran yg paling dalam. Berupa dinding tipis, transparan, menutupi otak dan meluas ke setiap lapisan daerah otak.menempel ketat pada jaringan otak)
- **ARACHNOID** (membran bagian tengah berada diantara duramater dan piamater. Berupa membran tipis lembut berwarna putih, menyerupai sarang laba-laba.

  dindingnya (*plexus khoroid* memproduksi CSS)

  Normal CSS:500ml/hr, 150 diabsorbsi oleh *villi arachnoid*.

# Organisasi Saraf

I. Saraf pusat:
   - Otak
   - Medula Spinalis

II. Saraf perifer:
   - Somatis
   - Otonom




**Sensoris**

**Motoris** → **simpatis**, **parasimpatis**

# Cedera kulit kepala

- Kulit kepala mengandung banyak vaskularisasi/pembuluh darah.
- Bila mengalami trauma kecil saja akan mengeluarkan darah.
- Trauma akan menyebabkan *abrasi, kontusio, laserasi, avulsi*
- Penanganan: irigasi, keluarkan benda asing,heacting,tutup luka.

# Cedera kepala

- Trauma yang meliputi kulit kepala, tengkorak dan otak.
- Mengakibatkan penyakit neurologik yang serius

# Trauma capitis

1. Fraktur
2. Komotio cerebri
3. Kontusio cerebri
4. Perdarahan intrakranial

# Fraktur Tulang tengkorak

- Tl tengkorak Terdiri dari Os calvaria dan Os basis cranii.
- Fraktur tl tengkorak adalah rusaknya kontinuitas tl tengkorak diseb oleh trauma, dapat terjadi dengan atau tanpa kerusakan otak
- Fraktur os calvaria berbentuk garis (linier): impresi dan non impresi
- Fraktur terbuka:mengakibatkan kerusakan duramater,harus lgsg dilakukan pembedahan

# Lanj…

- Fraktur basis cranii:fraktur di sinus paranasalis pd tl frontal  dan atau lokasi tengah telinga di tl temporal.
- Menimbulkan hemoraghi dari hidung, faring atau telinga dan perdarahan dibawah konjungtiva.
- , waspada pemasangan NGT,waspada pada penderita tidak sadar (obstruksi jalan nafas)
- Fraktur basis cranii dicurigai saat CSS keluar dari telinga (*otorea cerebrospinalis*) dan hidung (*rhinorea cerebrospinalis*)

# Cedera otak

- Cedera minor dapat menyeb kerusaan bermakna.
- Otak tdk dpt menyimpan nutrisi(Glukosa dan O2)
- Sel-sel cerebral membutuhkan suplai darah terus menerus u/regenerasi
- Kerusakan otak bersifat ireversibel
- Cedera otak serius dapat terjadi dengan atau tanpa fraktur tengkorak,
- Cedera otak dpt tjd stl mengalami trauma yang menimbulkan kontusio, laserasi, dan hemoragi otak

# Cedera otak

Cedera otak akibat trauma dapat disebabkan:

a. Cedera langsung (primer): kontusio cerebri, laserasi cerebri, perdarahan karena terputisnya pblh darah
b. Cedera tidak langsung (sekunder)

cedera sekunder dapat disebabkan oleh:

a) Hipovolemia : aliran darah ke otak berkurang, yang dpt menyeb iskemik otak bahkan infark otak
b) Hipoksia
c) Hiperkarbia dan hipokarbia.

   Pengaruh $CO_2$ sgt penting pd trauma capitis $\downarrow$ $CO_2$ dpt menyebabkan vasokonstriksi pblh drh otak, iskemia dan infark sebaliknya jk $CO_2 \uparrow$ menyeb vasodilatasi pblh drh otak,yg akan menyeb edema cerebri

Normal kadar $CO_2$ darah pd trauma capitis 26-32mmHg

# Komosio cerebri

- **Komosio cerebri** stl cedera kepala adl hilangnya fx neurologik sementara tanpa kerusakan struktur
- Meliputi periode tdk sadarkan diri slm bbrp detik-menit atau komplet sewaktu (<15mnt)
- Jk trauma melibatkan lobus frontal dan temporal pasien akan menunjukkan perilaku irasional yang aneh, amnesia atau disorientasi



## Komosio cerebri

- Observasi adanya sakit kepala, pusing, peka rangsang, ansietas (sindroma pasca komosio)
- Intervensi: beri penjelasan, informasi dan dukungan shg dpt mengurangi syndroma pasca komosio, lakukan aktivitas fisik dg lmbt
- Kelg dianjurkan u/ m'observasi adanya; Sukar bagun, sukar bicara,konfusi, sakit kepala berat, muntah, kelemahan salah satu sisi tbh, kembali ke RS

# Kontusio cerebri

- Mrp cedera kepala berat dmn otak mengalami memar bahkan dimungkinkan tjd hemoraghi.
- Kehilangn kesadaran lebih lama,dikenal dg DAI(difuse axonal injury), memiliki prognosis yg lbh buruk
- Tanda gejala: penurunan kesadaran, nadi lemah,pernapasan dangkal,kulit dingin dan pucat, sering tdpt defekasi dan miksi tanpa disadari,
- Umumnya megalami cedera luas, fx motorik abnormal, peningkatan TIK, pemulihan lambat

# *Hemoragi intrakranial* (Perdarahan di dalam otak)

- EPIDURAL HEMATOM (perdarahan terletak diantara tengkorak dan duramater)
- SUBDURAL HEMATOM (perdarahan diantara duramater dan dasar otak)
- INTRACEREBRAL HEMATOM (perdarahan didalam jaringan otak)

SDH

EDH

# Manifestasi klinis

- ✓ Gangguan kesadaran
- ✓ Konfusi
- ✓ Abnormalitas pupil
- ✓ Defisit neurologik
- ✓ Perub tanda vital
- ✓ Disfungsi sensori
- ✓ Kejang otot
- ✓ Sakit kepala
- ✓ Vertigo
- ✓ Gangguan pergerakan
- ✓ Kejang
- ✓ Syok hipovolumik
- ✓ Tanda lateralisasi
- ✓ anisokor

# penatalaksanaan

1. Sllu waspada thd adanya fraktur cervical, traksi ringan pd kepala dg neck collar/colar cervical
2. Airway dan breathing. Semua trauma capitis dpt menyeb ggn ventilasi, hipoksia dan hiperkarbia..
3. Circulation. Cdera kepala pasti menyeb ggn perfusi darah ke otak. kontrol hemorhagi,perbaiki hipovolemia.
4. Disability.,dilakukan dg penilaian GCS, pupil dan tanda lateralisasi.patau ketat thd PTIK (oksigenasi adekuat,peningkatan kepala tt,),pemberian manitol untuk mengurangi edema cerebral dan dehidrasi osmotik.penurunan GCS >1sgera konsultasi Dr SpBs.

   Semua terapi adl u/mempertahankan homeostasis otak dan **mencegah** kerusakan otak sekunder

# Glasgow Coma Scale (GCS)

Skala coma glasgow memberikan gambaran tiga bidang fungsi neurologik. tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi status neurologi lbh mendalam, cukup mengevaluasi motorik, verbal dan respon membuka mata.

| | |
|---|---|
| **Membuka mata** | |
| Spontan | 4 |
| Dengan perintah | 3 |
| Dengan nyeri | 2 |
| Tidak berespon | 1 |
| **Respon motorik** | |
| Dengan perintah | 6 |
| melokalisasi nyeri | 5 |
| Menarik area yang nyeri ‘ | 4 |
| Fleksi abnormal | 3 |
| Ekstensi abnormal | 2 |
| Tidak berespon | 1 |

| | |
|---|---|
| **Respon verbal** | |
| Berorientasi | 5 |
| Bicara membingungkan | 4 |
| Kata-kata tidak tepat | 3 |
| Suara tidak dapat dimengerti | 2 |
| Tidak ada respons | 1 |

# evalusi diagnostik

- Pemeriksaan fungsi neurologi
- Ro foto kepala 3 posisi
- CT(computed tomografi) scan (efektif dlm evaluasi jar lunak, menentukan lesi otak dan menentukan tindakan sljtnya)
- Angiography
- Echoencepalography